

Grøn rengøring

Procedure Plejeboligområdet

Emne: Noro virus.

Formålet:

- At forebygge spredning og smitterisiko.
- At hygiejniske forholdsregler håndteres korrekt og ens af alle involverede medarbejdere.
- At alle oplever, at smitteforebyggelse håndteres professionelt.

Henvender sig til: Alle ansatte i plejeboligområdet.

Kort beskrivelse af infektionen:

Norovirus er årsag til op imod halvdelen af alle udbrud af mave-tarm infektioner. Viser sig ved diarré, opkastninger, kvalme, hovedpine, feber evt. muskelsmerter. Inkubationstiden er 12-48 timer.

Smittespredning:

Norovirus er meget smitsom, både ved direkte og indirekte kontakt. Alkohol har ringe effekt på norovirus, derfor skal der opretholdes en god håndhygiejne med vand og sæbe.

Isolation og ophold i fælles miljø:

Borgeren skal opfordres til at blive i egen lejlighed så længe der er symptomer og helst op til 48 timer efter symptom frihed.

Hygiejniske foranstaltninger for at hindre smittespredning i pleje og omsorgen for beboeren:

Borgeren skal hjælpes til en god håndhygiejne.
Borgeren skal have rent tøj på dagligt.
Sengelinned der er synligt forurenet skal skiftes med det samme.

Værnemidler:

Der skal anvendes handsker og overtrækskittel i forbindelse i den direkte pleje af borgeren.
Hvis der er risiko for sprøjt eller stænk skal der anvendes maske/briller/mundbind.
Ovenstående skal også anvendes hvis borgeren skal have hjælp til spisning.

Pårørende/gæster:

Skal informeres om håndhygiejne med vand og sæbe.
Pårørende skal bære ovennævnte værnemidler i den direkte kontakt med borgeren.

Borgerens udskillelser, vasketøj og andet affald:

Ved håndtering af borgerens udskillelser anvendes handsker, overtrækskittel, evt. maske/briller/mundbind.

Vasketøj og linned kommes i opløselige poser i lejligheden og bringes direkte i vaskemaskine eller i linnedpose.

Dagligt skal håndklæder skiftes, og sengetøj skal skiftes ved synlig forurening, eller 1 gang om ugen.

Andet affald kommes i plastikpose som lukkes i lejligheden og kommes i affaldscontainer.

Service: Skal direkte i opvaskemaskinen.

Behandling:

Det er en læge, der skal tage stilling til om der skal opstartes behandling.

Obs borgeren bør tilbydes hyppigt væske og små måltider mad.

Transport:

Bør undgås så længe borgeren har symptomer og helst først 48 timer efter symptom frihed.

Hvis det ikke kan undgås skal eks. Falck, informeres, og helst bære værnemidler.

Kilder og referencer:

Nationale infektionshygiejniske retningslinjer.

<http://www.ssi.dk/Smitteberedskab/Infektionshygiejne/Retningslinjer/NIR.aspx>

Albertslund kommune har en hygiejne netværksperson, der også vil kunne være behjælpelig hvis der opstår tvivl.

Udarbejdet første gang:

20.11.13

Udarbejdet af:

Tina M. Sundstrøm

Revideret:

Omdøbt 18.03.14

Denne udgave er udsendt:

18.03.14

Acadre nr. 14/3633

Procedure Plejeboligområdet

Emne: Rengøring ved Norovirus

Formålet:

- At forebygge spredning og smitterisiko.
- At hygiejniske forholdsregler håndteres korrekt og ens af alle involverede medarbejdere.
- At alle oplever, at smitteforebyggelse håndteres professionelt.

Henvender sig til: Alle ansatte i plejeboligområdet.

Værnemidler:

Der skal bæres handsker ved rengøring.

Der skal bæres overtrækskittel, hvis der er risiko for, at få forurenet tøj.

Rengøring:

Dagligt skal kontaktpunkter aftørres med et klorholdigt produkt eller med sprit 70 %.

Kontaktpunkter er eks:

- Håndtag.
- Sengeheste og sengegalge.
- Vandhaner.
- Toiletsæde og toiletskylleknop.
- Nødkald og kontakter.
- Sengebord etc.

Ved spild/forurening med sekreter rengøres med almindeligt rengøringsmiddel efterfulgt af desinfektion med klorholdigt produkt svarerende til 1000 ppm aktivt klor eller med sprit 70 %.

Vær opmærksom på om eks. toiletrulle kan være inficeret, skift evt. denne.

Rengøringsmidler:

- Presept – 4 tabletter opløses i en 1. liter vand. (Dette er tabletter der opløses i vand og svarer til 1000 ppm aktivt klor)
- WetWipe – chlorine disinfection- klude. (Dette er imprægnerede engangsklude, med aktivt klor på 1000-1200 ppm.)

Støvsuger og andre flergangsmaterialer bør ikke anvendes.

Der skal udføres hånd desinfektion efterfølgende.

Procedure Plejeboligområdet

Emne: Rengøring ved Norovirus

Formålet:

- At forebygge spredning og smitterisiko.
- At hygiejniske forholdsregler håndteres korrekt og ens af alle involverede medarbejdere.
- At alle oplever, at smitteforebyggelse håndteres professionelt.

Henvender sig til: Alle ansatte i plejeboligområdet.

Værnemidler:

Der skal bæres handsker ved rengøring.

Der skal bæres overtrækskittel, hvis der er risiko for, at få forurenet tøj.

Rengøring:

Dagligt skal kontaktpunkter aftørres med et klorholdigt produkt eller med sprit 70 %.

Kontaktpunkter er eks:

- Håndtag.
- Sengeheste og sengegalge.
- Vandhaner.
- Toiletsæde og toiletskylleknap.
- Nødkald og kontakter.
- Sengebord. Etc.

Ved spild/forurening med sekreter rengøres med almindeligt rengøringsmiddel efterfulgt af desinfektion med klorholdigt produkt svarende til 1000 ppm aktivt klor eller med sprit 70 %.

Vær opmærksom på om eks. toiletrulle kan være inficeret, skift evt. denne.

Rengøringsmidler:

- Presept – 4 tabletter opløses i en 1. liter vand. (Dette er tabletter der opløses i vand og svarer til 1000 ppm aktivt klor)
- WetWipe – chlorine disinfection- klude. (Dette er imprægnerede engangsklude, med aktivt klor på 1000-1200 ppm.)

Støvsuger og andre flergangsmaterialer bør ikke anvendes.

Der skal udføres hånd desinfektion efterfølgende.

Kilder og referencer:

Nationale infektionshygiejniske retningslinjer.

<http://www.ssi.dk/Smitteberedskab/Infektionshygiejne/Retningslinjer/NIR.aspx>

Albertslund kommune har en hygiejne netværksperson, der også vil kunne være behjælpelig hvis der opstår tvivl.

Udsendt første gang:

20.11.13

Udarbejdet af:
Tina M. Sundstrøm

Revideret:

Omdøbt 18.03.14

Denne udgave er udsendt:

18.03.14

Acadre nr. 14/3633